




Koronawirus SARS-CoV-2 przeciwciała IgG i IgM TEST IMMUNOCHROMATOGRAFICZNY



Koronawirus SARS-CoV-2 przeciwciała IgG i IgM test Immunochromatograficzny to badanie serologiczne polegające na identyfikacji przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2.

W ramach testu następuje jakościowe oznaczenie przeciwciał w klasie IgM oraz IgG.

Do testu immunochromatograficznego pobiera się próbkę krwi żyłnej lub próbkę krwi włośniczkowej z palca.



Dodatni wynik badania może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości lub toczącej się infekcji i powinien być zweryfikowany innymi badaniami*, gdyż nie daje odpowiedzi na pytanie jak dawno miało miejsce zakażenie. Istnieje również ryzyko, że badany jest obecnie zainfekowany (w momencie pobrania).



Wynik ujemny badania świadczy, iż organizm nie wytworzył przeciwciał anti-SARS-CoV-2, nie wyklucza to jednak obecnego zakażenia wirusem**.

Test nie służy do rozpoznania COVID-19

WYNIKI		MOŻLIWA INTERPRETACJA	
IgM	IgG		
			
		** Badanie mogło być wykonane zanim organizm wytworzył przeciwciała W przypadku uzasadnionego podejrzenia kontaktu z wirusem należy wykonać test RT-PCR lub powtórzyć badanie serologiczne po 1-2 tygodniach	
		Wczesna faza infekcji SARS-CoV-2, wskazana weryfikacja testem RT-PCR	
		Infekcja wirusem SARS-CoV-2 na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, wskazana weryfikacja testem RT-PCR	
		Późna faza infekcji SARS-CoV-2, ozdrowienie	

Interpretacja wyników badań serologicznych identyfikujących przeciwciała IgM i IgG specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2.

*Pełna oferta badań w kierunku SARS-CoV-2 dostępna na stronie www.diagnostyka.pl

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji medycznych. Interpretacji wyników badań powinien dokonywać lekarz.

www.diagnostyka.pl

