

Il Piano Prevenzione Vaccini: dTpa, influenza e altre offerte vaccinali per gli adulti

Marino Faccini

Direttore UOC MPC – Malattie infettive

ATS Milano

Perché vaccinare gli adulti?

- Non ottimali coperture vaccinali
- Spostamento in avanti dell'età di infezione per alcune malattie (es. Morbillo)
- Aumento dei soggetti con patologie croniche o in terapia esposti a elevato rischio per alcune infezioni
- Disponibilità di nuovi e più efficaci vaccini

Dalle vaccinazioni dei bambini al calendario per la vita

Dalla copertura vaccinale alla solidarietà vaccinale tra le generazioni

PNPV 2017 - 2019. I vaccini per gli adulti

vaccino	19 /50 anni	51/64 anni	> 65 anni
Difterite Tetano Pertosse	Richiamo ogni 10 anni		
Epatite B	Solo per soggetti a rischio		
Haemophilus tipo B	Solo per soggetti a rischio		
Pneumococco	Solo per soggetti a rischio		Per tutti (a partire dai nati nel 1952) e per i soggetti a rischio
Morbillo Parotite Rosolia	Per tutti i soggetti non vaccinati e che non abbiano contratto anche solo una delle 3 malattie (morbillo – parotite – rosolia)		
Varicella	Per tutti i soggetti non vaccinati e che non abbiano contratto la varicella		
Meningococco B/C/ACWY	Solo per soggetti a rischio		
HPV (Papilloma Virus)	Solo per soggetti a rischio (secondo i limiti di età di utilizzo del vaccino)		
Influenza	Solo per soggetti a rischio		Per tutti
Zoster		Solo per soggetti a rischio	Per tutti (a partire dai nati nel 1952) e per i soggetti a rischio
Epatite A	Solo per soggetti a rischio		

Vaccini obbligatori e Sport. Legge 5 marzo 1963, n. 292

E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per alcune categorie di lavoratori

b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

Le belle risposte alla mamma no vax che si indigna perché il figlio non può giocare a rugby

@neXt quotidiano | 6 ottobre 2017

Mi piace | Condividi 530 | Tweet



IL CASO


Escluso dalla squadra di pallanuoto «Non ha fatto il vaccino antitetanico»

Udine, il medico sportivo non rilascia l'idoneità a un bimbo di 8 anni figlio di no-vax

Non solo tetano, l'importanza del richiamo DTP


- Per gli adolescenti a 15 anni (anticipato a 12 anni con la vaccinazione HPV)
- Per tutti gli adulti, ogni 10 anni
- Per tutte le gravide, ad ogni gravidanza nella 28° settimana per proteggere il neonato dalla pertosse nei primi mesi di vita
- Un vaccino che non toglie nulla alla sicurezza dei vaccini solo T o solo DT

Razionale per utilizzo dTpa nell'adolescente e nell'adulto




P. Bonanni et al. Acellular pertussis vaccine use in risk groups (adolescents, pregnant women, newborns and health care workers): A review of evidences and recommendations. Vaccine 2012

Pertosse. Casi per classi di età. ATS Milano, anni 2015-2019




Morbillo in ATS Milano

- - - 2018 casi 126 — 2019 casi 249



- Età media 30 anni
- 70% dei casi in età giovane-adulta
- Tasso di incidenza per età più elevato in lattanti < 1 anno (contagiati dai genitori)



Non vale per il vaccino antimorbillo…

- Fare una sola dose, le dosi sono sempre due a distanza minima di 4 settimane
- Pensare di essere protetti per il ricordo anamnestico di aver fatto la malattia, non è attendibile
- Ritenere che in un adulto il vaccino sia pericoloso
- Supporre che avendo già contratto la parotite e/o la rosolia questo sia una controindicazione al vaccino MPR, non essendo disponibile il vaccino monocomponente
- Se l'adulto non è protetto dalla varicella, è disponibile il vaccino combinato MPRV, che segue lo stesso calendario di MPR

Indovina chi?



Chi non dovrebbe vaccinarsi contro l'influenza?

adulto di età < 60 anni, in buona salute
normopeso
con test di gravidanza negativo
che non stia vicino a nessun soggetto a rischio
che non svolga una attività di pubblica utilità
non sia operatore sanitario
non sia donatore di sangue
non faccia il veterinario
non allevi galline

http://www.adultievaccinati.it/2017/10/31/indovina-chi/

Anteprima risultati vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 ATS Milano

Somministrate 660.220 dosi (+ 189.222)

Over 65 anni 459.836 (+ 76.005)

Cronici 101.474 (+ 48.096)

Operatori sanitari 20.009 (+ 7.951)


Gravidanza 4.998 (+ 1.650)

Bambini 6 mesi – 6 anni 35.428


Ragazzi 7 – 18 anni: 23.060



Pneumococco in ATS Milano
Incidenza per classi d'età, 2010 - 2018



Vaccino antipneumococco



- Vaccino Pneumo 13 coniugato + Polisaccaridico 23 valente dopo 12 mesi (dopo 8 settimane nei soggetti ad alto rischio)
- Offerta gratuita ai 65 enni (nati nel 1955) e ai soggetti cronici di qualunque età

Il «fischio di inizio» del progetto sport e vaccini

Capitolo sulle vaccinazioni nel **manuale** «Medico del Calcio» del Prof. Volpi, responsabile sanitario F.C. Internazionale Milano.





Sport e vaccini: una squadra vincente









Campagna social di ATS Milano



Grazie per l'attenzione