



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

CONVEGNO

LE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Lesioni dermatologiche da IST

Mantova, 09/11/2024

Dott. Giacomo Dal Bello

Macula

Lesione piana e non infiltrante, caratterizzata da una modificazione del colore

Infettive

- Tinea cruris (Epidermophyton floccosum e Trichophyton rubrum)
- Candida
- Eritrasma (Corynebacterium minutissimum)

Infiammatorie

- Intertrigine
- Psoriasi
- Vitiligine
- Dermatite atopica
- Lichen sclerosus genitale
- Balanite di Zoon

Neoplastiche

- Eritroplasia di Queyrat
- Micosi fungoide

Tinea cruris



Macule eritemato-brunastre di forma irregolare con risoluzione centrale

Candida



Macule eritematose con pustole. Odore di lievito o birra

Eritrasma



Macule eritemato-brunastre senza risoluzione centrale. Fluorescenza rosso-corallo alla Wood

Intertrigine



Macule eritematose con fissurazioni e erosioni. Guardare addome, ascelle, sottomammaria

Psoriasi



Macule eritemato-desquamative. Guardare gomiti, ginocchia, sacro, scalpo, unghie

Vitiligine



Macule depigmentate. Guardare peri-oculare, peri-orale, mani

Dermatite atopica




Macule eritematose, ipocromiche, ipercromiche pruriginose con solchi e quadrettature.
Guardare volto, collo, pieghe antecubitali e cavi poplitei

Lichen sclerosus



Macule eritematose e biancastre, pruriginose con ragadi

Balanite di Zoon



Macula rosso «laccato». Lesione analoga «a stampo» sul prepuzio

Eritroplasia di Queyrat



Macula eritematosa asintomatica

Micosi fungoide



Macule eritematose «a carta di sigaretta», asimmetriche, pruriginose, progressive

Papula

Lesione rilevata rispetto al piano cutaneo (< 10 mm)

Infettive

- Condilomi
- Molluschi contagiosi
- Condiloma lata

Infiammatorie

- Lichen ruber planus

Fisiologiche

- Papule perlacee del pene

Condiloma



Papule verrucose rosa-grigio asintomatiche

Mollusco contagioso



Papule rosa ombelicate asintomatiche

Condiloma lata



Papule lisce rosa-grigio

Lichen ruber planus



Papule poligonali pruriginose violacee. Guardare polsi, avambracci, fianchi

Papule perlacee del pene



Papule lisce rosee attorno alla corona del glande

Nodulo

Lesione rilevata rispetto al piano cutaneo estesa fino al derma o sottocute

Infettive

- Sifilide primaria
- Scabbia

Infiammatorie

- Idrosadenite suppurativa

Neoplastiche

- Carcinoma squamocellulare

Sifilide primaria



Nodulo ulcerato, singolo, non dolente. Mai fidarsi dei pazienti

Scabbia



Noduli multipli pruriginosi, cunicoli e papule. Guardare polsi, ascelle, spazi interdigitali

Quando il paziente ha prurito diffuso...



Idrosadenite suppurativa



Noduli multipli dolenti, pustole, ascessi e fistole. Guardare glutei e ascelle

Idrosadenite suppurativa (II)



Comedoni multipli

Carcinoma squamocellulare



Nodulo ulcerato unico

Vescicola

Lesione rilevata rispetto al piano cutaneo a contenuto liquido chiaro (< 5 mm)

Infettive

- Herpes simplex
- Herpes zoster
- Mpox (monkeypox)

Infiammatorie

- Dermatite erpetiforme

Miscellanea

- Linfangiomatosi localizzata acquisita

Herpes simplex



Vescicole «a grappolo» dolenti o urenti. Possono coesistere pustole ed erosioni

Herpes zoster



Vescicole dolenti o urenti a disposizione metamerica. Possono coesistere pustole ed erosioni

Mpox (monkeypox)



Vescicole ombelicate. Possono coesistere pustole

Dermatite erpetiforme



Vescicole «a grappolo» pruriginose. Guardare fianchi, gomiti e ginocchia. Sintomi gastro-enterici

Linfangiomatosi localizzata acquisita



Vescicole asintomatiche. Dopo interventi chirurgici

Pustola

Lesione rilevata rispetto al piano cutaneo contenente pus (< 10 mm)

Infettive

- Follicolite (Staphylococcus aureus)
- Follicolite da idromassaggio (Pseudomonas aeruginosa)
- Candida

Infiammatorie

- Idrosadenite suppurativa

Folliculite



Pustole follicolari

Follicolite da idromassaggio



Pustole follicolari su cute flegmasica

Candida



Macule eritematose con pustole. Odore di lievito o birra

Idrosadenite suppurativa



Pustole, noduli, ascessi e fistole. Guardare glutei e ascelle

Ulcera

Lesione che deriva da una perdita di tessuto

Infettive

- Sifilide primaria
- Ulcera molle (*Haemophilus ducreyi*)

Infiammatorie

- Malattia di Adamantiades-Behçet

Neoplastiche

- Carcinoma squamocellulare

Sifilide primaria



Ulcera singola, non dolente. Mai fidarsi dei pazienti

Ulcera molle (cancroide)



Ulcere multiple, dolenti. Mai fidarsi dei pazienti

Malattia di Adamantiades-Behçet



Ulcere multiple, metacrone, dolenti. Guardare bocca e occhi. Origine geografica

Carcinoma squamocellulare



Nodulo ulcerato unico